

藥師檢核表一

Roaccutane® (Isotretinoin) 羅可坦® 發放指引

Roaccutane® 屬於視黃醇類藥物，會導致嚴重的先天缺陷。若胎兒暴露於 Roaccutane®（即使暴露時間短），很可能發生先天性畸形及流產。

因此，除非符合《Roaccutane® 避孕計劃》之所有條件，否則懷孕期間或具生育能力的女性嚴格禁止使用 Roaccutane®。

應儘量於開立及發放 Roaccutane® 的當天，同時取得陰性的懷孕檢測結果。

若您發現以 Roaccutane® 治療的女性已懷孕，應立即停止其治療，並即刻將其轉介至原開立處方之醫師。

若您發現女性患者已懷孕且停用 Roaccutane® 未達一個月，應將其轉介至原開立處方之醫師。

身為藥師，在發放 Roaccutane® 之前務必確認以下資訊：

針對具生育能力的女性：

開立 Roaccutane® 時，應以不超過 30 天藥量為佳，以便進行包含懷孕檢測及監測之常規追蹤。

針對所有患者的注意事項：

不可將 Roaccutane® 給予其他人。

療程結束時，將未使用之膠囊歸還其藥師。

Roaccutane® 治療期間及停藥後一個月內不可捐血，因為懷孕女性於接受輸血後對其胎兒具有潛在風險。